PROPOSITIONS

N° 139.

D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE;

THÈSE

Présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 31 juillet 1826, pour obtenir le grade de Docteur en médecine,

PAR ALEXANDRE DUBLED, de Saulieu,

Département de la Côte-d'Or,

Ancien Interne des hôpitaux et hospices civils de Paris; Élève de première classe de l'Ecole pratique.

Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certè adolescentiæ propior, manu strenuâ, stabili nec unquàm intremiscente; edque non minùs sinistrâ quàm dextrâ promptus; acie oculorum acri clarâque, animo intrepidus, misericors sic ut sanari velit eum quem accipit, non ut clamore ejus motus, vel magis quàm res desiderat properet, vel minùs quàm necesse est secet; sed perindè faciat omnia, ac si nullus, ex vagitibus alterius affectus oriatur.

A. C. CELSUS. Lib. 7.

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT LE JEUNE,

Imprimeur de la Faculté de médecine, rue des Maçons-Sorbonne, n.° 13.

1826.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.

Professeurs.

M. LANDRÉ-BEAUVAIS, Doyen.	Messieurs
Anatomie	CRUVEILHIER.
Physiologie	DUMÉRIL.
Chimie médicale	ORFILA.
Physique médicale	PELLETAN fils.
Histoire naturelle médicale	CLARION, *Suppléant.*
Pharmacologie	GUILBERT.
Hygiène	BERTIN.
Pathologie chirurgicale	MARJOLIN. ROUX.
Pathologie médicale	FIZEAU, *Examinateur.* FOUQUIER.
Opérations et appareils	RICHERAND.
Thérapeutique et matière médicale	ALIBERT.
Médecine légale	ADELON.
Accouchemens, maladies des femmes en couches et des enfans nouveau-nés	DÉSORMEAUX.
Clinique médicale	CAYOL. LAENNEC. LANDRÉ-BEAUVAIS. RÉCAMIER, *Examinateur.*
Clinique chirurgicale	BOUGON. BOYER. DUPUYTREN, *Président.*
Clinique d'accouchemens	DENEUX, *Examinateur.*

Professeurs honoraires.

MM. CHAUSSIER, DE JUSSIEU, DES GENETTES, DEYEUX, DUBOIS, LALLEMENT, LEROUX, MOREAU, PELLETAN père, PINEL VAUQUELIN.

Agrégés en exercice.

Messieurs	Messieurs
Arvers.	Maisonnab.
Breschet.	Moreau.
Capuron.	Murat.
Chomel.	Parent du Chatelet.
Cloquet aîné.	Pavet de Courteille.
Coutanceau.	Ratheau.
De Lens.	Richard.
Gaultier de Claubry, *Examinateur.*	Ruilier.
Gérardin, *Examinateur.*	Ségalas.
Guersent, *Suppléant.*	Serres.
Jadioux.	Thévenot.
Kergaradec.	

Par délibération du 9 décembre 1798, l'École a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui sont présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A MONSIEUR

LE DOCTEUR GILBERT,

Chirurgien en second de l'hôpital des Vénériens ; Membre de l'Académie royale de médecine, etc.

Vous dirigeâtes mes premiers pas dans la carrière médicale, et je trouvai toujours en vous un appui généreux. Puissiez-vous agréer ce faible témoignage de la vive reconnaissance

DE VOTRE ÉLÈVE,

A. DUBLED!

AVERTISSEMENT.

Attaché au service des hôpitaux pendant quatre années consécutives, j'ai pu me convaincre chaque jour combien il était difficile d'innover en médecine, et combien l'observation l'emportait sur les systèmes.

Aussi, bien pénétré de cette vérité, je n'ai eu pour but dans ma thèse que d'offrir le résultat pratique des faits que j'ai observés.

Puisse cette considération excuser auprès de mes juges l'exiguité de mon travail! Puissent-ils aussi demeurer persuadés que leurs leçons n'ont pas été infructueuses!

PROPOSITIONS

D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE.

I.

Les altérations dont la glande thyroïde peut devenir le siége dans la maladie connue sous le nom de *goître*, sont très-variables.

Ainsi, dans un goître que j'ai disséqué le 10 mai 1826, à l'école pratique, je trouvai qne la glande thyroïde égalait le volume des deux poings; qu'au centre de cette tumeur existaient deux petites cavités, tapissées l'une et l'autre par des lambeaux de fausses membranes, contenant, l'une des caillots de sang noirâtre; l'autre, une matière puriforme jaunâtre, mêlée de débris de la glande. Çà et là existaient des tissus fibreux, fibro-cartilagineux, et même osseux.

La structure granuleuse de la glande n'existait plus qu'à sa circonférence.

II.

Les veines du cerveau peuvent être distinguées en externes et en internes.

Les veines externes et supérieures naissent du sinus longitudinal supérieur, par six ou huit gros troncs pour chaque hémisphère, sur lequel ils se répandent en s'anastomosant avec les veines externes et inférieures. Ces dernières sont fournies par deux troncs, dont l'un

antérieur donne naissance à la veine ophthalmique, et s'ouvre dans le sinus pétreux supérieur; le tronc postérieur est le plus gros : il naît du sinus latéral à l'endroit où ce dernier communique avec l'extérieur du crâne par la veine mastoïdienne.

Les veines internes du cerveau sont connues et d'écrites sous le nom de *veines de Galien.*

III.

Si une plaie transversale qui siége dans le flanc est pénétrante et compliquée de l'issue, puis de l'étranglement de l'intestin, l'étroitesse de l'ouverture faite à la peau, peut seule occasionner ce dernier accident.

IV.

L'adhérence de deux séreuses enflammées peut exister au bout de quatre heures de contact.

V.

Il est bien difficile de déterminer l'époque à laquelle doit être pratiquée une opération de hernie étranglée. Quelquefois la gangrène, ou, ce qui est aussi funeste, une péritonite se déclare au bout de deux jours; d'autres fois au bout de quatre et même cinq jours.

VI.

Dans les inflammations de l'intestin grêle par causes externes, telles que plaies, étranglement, etc., le malade rapporte sa douleur la plus vive au centre épigastrique.

VII.

Dans les hernies de la tunique vaginale (congénitales des auteurs), l'étranglement existe le plus souvent à l'orifice supérieur du canal inguinal, et est ordinairement formé par le collet du sac.

VIII.

Il résulte de cette disposition, que, dans le cas où cette espèce de hernie seroit gangrenée, on ne pourrait point opérer le débridement, et qu'il faudrait se contenter d'établir un anus artificiel. (Ce précepte appartient à M. le professeur *Dupuytren*).

IX.

Si l'incision du ligament de *Gimbernat* ne suffit pas pour opérer le débridement de la hernie crurale chez l'homme, c'est en haut et en dehors qu'il faut inciser. (Clinique de M. le prof. *Dupuytren.*)

X.

Il résulte de quelques observations faites à l'Hôtel-Dieu, que les individus d'un tempérament lymphatique sont le plus souvent affectés de cataracte molle ; tandis que chez les individus dont le tempérament est ou sanguin ou bilieux, la cataracte est plus consistante.

XI.

M. *Dupuytren* avait depuis long-temps remarqué qu'il est des cataractes qu'il faut broyer, et d'autres qu'on peut abaisser en masse ; et que, dans l'un ou l'autre cas, on n'a pas à choisir entre l'un ou l'autre procédé.

XII.

Au début des abcès profonds des membres, la peau est roulante sur le tissu cellulaire sous-cutané, et l'on sent une dureté marquée au-dessous de ce dernier.

XIII.

Les tumeurs blanches des articulations coïncident le plus souvent avec une lésion organique des poumons, ne donnant que peu ou

point de signes de son existence avant l'opération. Mais après l'amputation du membre, le malade éprouve un peu de gêne dans la respiration, et, en sus, des abcès se forment dans le tissu cellulaire du moignon. Tant que ces abcès fournissent du pus, l'affection de poitrine reste stationnaire, ou bien n'a qu'une marche lente; mais elle devient active si les abcès se vident et s'il ne s'en forme d'autres.

XIV.

Les tissus fibreux d'abord, puis osseux, doivent être considérés comme suppléans d'action des tissus cutané et muqueux. C'est ainsi que, dans la production des tumeurs blanches, les exhalations cutanée et muqueuse sont presque nulles. Les mêmes phénomènes s'observent chez les individus scrophuleux et qui sont affectés spontanément d'abcès profonds dans les membres.

XV.

Chez une femme jeune, morte vingt-deux jours après son accouchement, et qui avait présenté des symptômes obscurs de métrite, j'ai trouvé l'utérus haut de quatre pouces, et présentant à sa surface interne des débris de matière placentaire altérée. En pressant l'utérus par sa face interne, on faisait sortir une multitude de gouttelettes purulentes. Ce pus, qui *n'existait que dans les veines* de l'utérus, s'étendait dans les gros troncs qui partent de cet organe jusqu'à la distance de deux pouces. Au-delà existait un peu de sanie purulente.

HIPPOCRATIS APHORISMI

(*Edente* PARISET).

I.

Famem vini potio solvit. *Sect.* 2 , *aph.* 21.

II.

Omnia secundùm rationem facienti , et non secundùm rationem evenientibus , non ad aliud transeundum , manente eo quod ab initio visum est. *Ibid.* , *aph.* 52.

III.

Senes ut plurimùm quidem juvenibus minùs ægrotant ; quicumque verò ipsis morbi fiunt diuturni , plerùmque commoriuntur. *Ibid.* , *aph.* 39.

IV.

Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit , non coalescit. *Sect.* 6 , *aph.* 24.

V.

Si omentum exciderit , necesse est putrefieri. *Ibid.* , *aph.* 58.

VI.

Quæ medicamenta non sanant , ea ferrum sanat ; quæ ferrum non sanat , ea ignis sanat ; quæ verò ignis non sanat , ea insanabilia existimare oportet. *Sect.* 8, *ap.* 6.